

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Regisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux Agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège  
rédigé en collaboration avec MM Dovale, Escande, Vène, Faure, Boy, Bernard  
(Sicard, Duboin par téléphone)

N° 12 C du 19 AVRIL 1990

GRANDES CULTURES N° 5

<b>BLE</b>	déjà traités	épiés non épiés	RENOUVELEZ ATTENDEZ
	pas encore traités	épiés non épiés	TRAITEZ traitez si RB/F3
<b>ORGE</b>	Traitement d'épiaison		
<b>POIS</b>	Renouvellement de la protection		
<b>COLZA</b>	RAS		

: : : : :  
: COMMUNIQUE :  
: : : : :

Compte tenu des conditions particulières de l'année, la société BAYER nous demande de ne pas préconiser l'utilisation de ses spécialités suivantes :

HORIZON  
LIBERO  
ONDENE

L'application risquant en effet de marquer la végétation des céréales stressées par la sécheresse, au même titre que l'an dernier

La réalisation d'un traitement doit toujours être effectuée dans les meilleures conditions possibles du moment

L'efficacité recherchée passe par le bon réglage de l'appareil, le bon dosage du ou des produits en fonction de la cible (Rouille brune, Septoriose, Pucerons, etc) et des conditions extérieures (T°, vent), gages d'efficacité, de diminution du risque de phytotoxicité et du respect de l'environnement

En conditions venteuses et sèches choisissez de préférence le matin tôt ou la fin de journée pour appliquer vos fongicides

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5. place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tel. 67.92 41 42



## BLE

### ROUILLE BRUNE

La Rouille Brune a peu évolué au cours des 2 dernières semaines; il faut cependant s'attendre à la voir se multiplier rapidement à partir de l'épiaison, suite aux dernières pluies, un relèvement rapide des T° favoriserait la maladie

Là où elle s'est manifestée précocement Razès, Carcassès le renouvellement de la protection est à envisager au moment de l'épiaison

Pour certaines parcelles malmenées par la sécheresse et marquées par les traitements précédents la réflexion s'impose; un bilan sérieux de la culture est à faire avec votre technicien avant de réappliquer un fongicide

Dans quelques situations du Lauragais, sur des cultures tardives, la rouille a fait son apparition; la règle reste la protection des 3 derniers étages foliaires; un premier traitement est à réaliser si vous êtes dans ce type de situations (céréale au stade 8)

L'OIDIUM est toujours présent, mais devrait être éliminé par le traitement dirigé contre la rouille; son impact sur le potentiel de la culture est très limité et ne devrait pas constituer la cible unique d'une intervention

: : : : :  
: SURVEILLEZ ATTENTIVEMENT VOS CULTURES :  
: : : : :

### QUE FAUT-IL FAIRE ?

**PARCELLES DEJA TRAITÉES** sauf cas particulier attendez l'épiaison vous interviendrez avec une des spécialités suivantes :

SPOT	1,5	l/ha
PLANETE R	1,5	l
ALTO AMBEL	0,5	l

intéressant en cas de Septo **ALTO MARATHON** 2 l

**PARCELLES NON TRAITÉES** : 2 cas peuvent se présenter :

\* vous êtes proche de l'épiaison, la rouille est peu importante, attendez l'épiaison utilisez les spécialités citées au paragraphe ci-dessus

\* vous êtes plus ou moins proche de l'épiaison, la rouille se manifeste sur F4 et commence d'être observée sur F3, traitez sans attendre à l'aide d'une des spécialités suivantes :

SUMISTAR	2,5	l/ha
ALTO AMBEL	0,5	l
SPOT	1,5	l
PLANETE R	1,5	l



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
ÉDITION DE LA STATION ANTHROPOMÉTRIQUE  
Midi-Pyrénées - Bâtiment 7 - 31000 TOULOUSE  
JOSÉE MONTREUIL CEEB - Tél. 43.42.43

Imprimé en France par les Établissements Agricoles - Le Quercy, 41, rue de la République - 31000 TOULOUSE  
Tous droits réservés. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite.

## **PUCERONS DES EPIS**

On peut observer sur des parcelles épiées la présence de pucerons des épis; il convient de stopper leur évolution; si 1 épi sur 2 porte au moins 1 puceron, rajoutez au fongicide choisi un des insecticides suivant :

KARATE	0,125	l/ha
TALSTAR	0,05	l
MAVRIK	0,15	l
DECIS	0,25	l
SERK	1,5	l
PIRIMOR	0,25	kg

## **ORGES**

Ces cultures arrivées à l'épiaison seront protégées dès réception du présent avis à l'aide d'un des fongicides suivant :

PUNCH C	0,8	l/ha
MAGIC	1,5	l
STARK	0,8	l

## **POIS PROTEAGINEUX**

Il convient de renouveler la protection de ces cultures

Les risques sont toujours les mêmes avec peut-être en plus l'arrivée du BOTRYTIS si les conditions humides du moment persistent

Vous pouvez utiliser une des solutions suivantes :

BRAVO PLUS	2	l/ha
CERECLAIR	2	l
PELTAR FLO	5	l
IMPACT EM	1	l

Il convient de rajouter au fongicide :

\* si PUCERONS + BRUCHES (pois de semence)

SERK	1,5	l
------	-----	---

\* si PUCERONS seuls

PIRIMOR	0,5	kg
KARATE	0,125	l
MAVRIK	0,2	l
DECIS	0,5	l

## **COLZA**

RAS

## **TOURNESOL**

Les 1<sup>re</sup> cultures sont levées

Comme par le passé nous assurons le suivi biologique du PHOMOPSIS; vous serez régulièrement tenus au courant de l'évolution du risque et de la conduite à tenir